

میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در استان چهارمحال و بختیاری در سالهای ۱۳۸۰-۱۳۹۰

سجاد رحیمی پردنجانی^۱، محمود وکیلی^۲، فاطمه چاه متکی^۳، محمد انصاری^۴، نجیب الله بالاراده^{۵*}، بهزاد پورمحمدی^۶

(گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران، گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران، گروه پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران)

تاریخ وصول: ۱۳۹۴/۸/۲۶ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

زمینه و هدف: سرطان‌ها یکی از عوامل کشنده در جهان پس از بیماری‌های قلبی - عروقی می‌باشند. سرطان کولورکتال سومین بدخیمی‌شایع در جهان است. این سرطان دو میان علت مرگ در آمریکا می‌باشد. در ایران نیزیکی از سرطان‌های شایع دستگاه گوارش می‌باشد. هدف از این مطالعه برآورد میزان بقای بیماران سرطان کولورکتال در استان چهارمحال و بختیاری بود.

روش بررسی: این یک مطالعه مشاهده‌ای از نوع تحلیلی بوده است، که به روش طولی و مطالعه بقاء انجام شده است. جامعه مورد بررسی شامل کلیه بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال که در استان چهارمحال و بختیاری ساکن هستند می‌باشد. با مراجعه به مرکز ثبت سرطان استان چهارمحال و بختیاری تمام موارد سرطان کولورکتال در سالهای ۱۳۸۰-۱۳۹۰ به روش سر شماری وارد مطالعه شدند، تعداد ۴۵۲ مورد به دست آمد. با مراجعه به مرکز ثبت مرگ و میر این استان زمان دقیق مرگ آنها استخراج شد. روش آماری حد حاصل ضرب کاپلان مایر استفاده شد و همچنین برای مقایسه توابع بقاء در زیر گروه‌های مختلف از آزمون‌های رتبه لگاریتمی یا آزمون تعمیم یافته ویلکاکسون (گهان، برسلو) استفاده شد.

یافته: از مجموع ۴۵۲ بیمار مبتلا به سرطان کولورکتالی که در طی یک دوره ۱۰ ساله جمع‌آوری شده‌اند، ۲۲۲ نفر (۵۱/۳ درصد) مرد و ۲۲۰ نفر (۴۸/۷ درصد) زن بودند. میانگین سنی افراد مبتلا به سرطان کولورکتال $۵۹/۱۲ \pm ۱۹/۹۹$ سال و میانه سنی افراد نیز $۶/۰$ سال بوده است. احتمال بقای ۱ و ۵ و ۱۰ ساله در آنها به ترتیب معادل $۸۵/۷$ ، $۷۱/۹$ و $۵۲/۵$ درصد محاسبه شد و همچنین میانه بقا نیز $۶/۰ \pm ۰/۴۴$ سال برآورد شد.

نتیجه‌گیری: با این که میزان بقای سرطان کولورکتال در استان چهارمحال و بختیاری در حد مطلوب می‌باشد با توجه به این که عوامل زیادی این میزان را تحت تأثیر قرار می‌دهند نیاز به مطالعه‌ای جهت شناسایی عوامل پیش‌آگهی کننده بر روی آن می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: میزان بقاء، بیماران، سرطان کولورکتال

*نویسنده مسئول: نجیب الله بالاراده، یزد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Email: n.baerade@yahoo.com

مقدمه

میزان بروز پائین شامل آفریقا، آسیا جنوبی و مرکزی، چین، هندوستان و جنوب آمریکا بوده است(۱۱ و ۸). تفاوت بزرگ جغرافیایی در توزیع جهانی سرطان کولورکتال وجود دارد. سرطان کولورکتال به طور عمدۀ بیماری کشورهای توسعه یافته با فرهنگ غربی است. درحقیقت جهان توسعه یافته ۶۳ درصد موارد را شامل می‌شود(۱۲). جمعیت‌های مختلف در سطح جهان میزان بروز متفاوتی دارند و این میزان بروز با گذشت زمان تغییر می‌کند. در بعضی جمعیت‌ها میزان بروز بیماری در هر دو جنس روند نزولی داشته است(۳). در بعضی دیگر از مناطق مانند شرق اروپا در هر دو جنس میزان بروز روند صعودی داشته است(۱۳). سالیانه نزدیک به یک میلیون مورد جدید سرطان کولورکتال در سرتاسر جهان شناسایی می‌شود و نزدیک به نیم میلیون مورد به علت این بیماری می‌میرند(۱۴). میزان بقای سرطان کولورکتال در سطح جهان تغییرات عمده‌ای دارد به طوری که میزان بقاء بر اساس مطالعه‌های انجام شده در سطح جهان بین ۱۳ تا ۶۶ درصد متغیر است(۱۵ و ۱۶). میزان بقاء در مناطق انگلستان، اروپا و ایالت متحده آمریکا با هم متفاوت هستند(۱۷)، مطالعه‌های انجام شده در ایران نیز میزان بقای ۵ ساله را بین ۴۷ تا ۵۰ درصد به دست آورده‌اند(۱۸ و ۱۹). به طور کلی بقاء در زنان کمی بیشتر از مردان است(۱۷). سن، مرحله TNM، متاستاز دوردست، درجه و اندازه تومور از فاكتورهای مهم پیش اگهی کننده سرطان کولورکتال می‌باشد(۲۰-۲۲).

سرطان‌ها یکی از عوامل کشنده در جهان پس از بیماری‌های قلبی - عروقی می‌باشد(۱). دومین علت مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و سومین عامل مرگ و میر در کشورهای کمتر توسعه یافته‌اند(۲ و ۳). در ایران پس از بیماری‌های قلبی - عروقی و سوانح، سرطان سومین علت مرگ و میر می‌باشد(۴). این سرطان سومین بدخیمی شایع در جهان (۵) و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در ایالت متحده آمریکا می‌باشد(۶). بررسی اطلاعات ۱۳۷۵ بیانگر افزایش سرطان کولورکتال بوده است، به طوری که این سرطان در ایران از رتبه ۹ در بین ده سرطان شایع به رتبه ۵ صعود کرده است(۵) و در حال حاضر یکی از شایع‌ترین سرطان‌های دستگاه گوارش در ایران سرطان کولورکتال است که از نظر بروز در مردان ایرانی رتبه ۵ در زنان ایرانی رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است(۷).

سرطان کولورکتال علت ۱/۲ میلیون مورد جدید و ۷۰۰ و ۶۰۸ در ۲۰۰۸ در جهان بوده است(۸). سرطان کولورکتال شایع‌ترین علت مرگ ناشی از سرطان در بین افراد غیر سیگاری ایرانی است(۹). میزان میرگ و میر سرطان کولورکتال در سرتاسر جهان تقریباً نیمی از میزان بروز آن است(۱۰). مناطق با میزان بالای بروز سرطان کولورکتال شامل استرالیا، نیوزیلند، شمال آمریکا، کانادا و قسمت‌هایی از اروپا می‌باشد و مناطق با

تعداد در حدود ۴۵۲ مورد برآورد شد. کلیه بیماران مبتلا به انواع مورفوЛОژی تشخیص داده شده ای سرطان کولورکتال در استان چهار محال و بختیاری به عنوان معیار ورود انتخاب و بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال که از این استان نیستند و بیماران سرطانی که به هر دلیلی غیر از سرطان کولورکتال فوت کرده اند و همچنین بیماران مبتلا به دو سرطان اولیه هم زمان را به عنوان معیار خروج از مطالعه در نظر گرفته شد. با مراجعه به مرکز ثبت مرگ و میر این استان زمان دقیق مرگ آنها استخراج شده است. مواردی که در مرکز ثبت مرگ موجود نبود را از طریق تماس تلفنی با خانواده و نزدیکان آنها زنده بودن یا مرگ آنها را جویا شده و در صورتی که بیمار فوت شده زمان دقیق مرگ درچک لیست ثبت شد.

داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و STATA و آزمون های آماری حد حاصل ضرب کاپلان مایر استفاده و همچنین برای مقایسه توابع بقاء در زیر گروه های مختلف از آزمون های رتبه لگاریتمی یا آزمون تعییم یافته ویلکاکسون (گهان، برسلو) استفاده شد.

یافته ها

از مجموع ۴۵۲ بیمار مبتلا به سرطان کولورکتالی که در طی یک دوره ۱۰ ساله جمع آوری شده اند ۲۳۲ نفر (۵۱/۳ درصد) مرد و ۲۲۰ نفر (۴۸/۷ درصد) زن بودند. میانگین سنی افراد مبتلا به سرطان

در سال های اخیر به واسطه غربالگری و تشخیص نزد رس و بهبود روش های درمانی میزان بقای سرطان کولورکتال روند افزایشی داشته است (۲۴ و ۲۵). سرطان کولورکتال یک بیماری چند عاملی است (۲۶). تنوع جغرافیایی مشخص شده و روند زمانی در بروز سرطان کولورکتال نشان می دهد که فاکتورهای زیست محیطی یا سبک زندگی عوامل عمده علت این بیماری هستند. به نظر می رسد، عوامل محیطی نقش مهمتری در ایجاد سرطان کولورکتال داشته باشد. این بیماری، در نواحی شهری و در افراد با طبقات بالای اجتماعی اقتصادی شایع تر است (۲۶). در این پژوهش با توجه به اهمیت سرطان کولورکتال و این که مطالعه های مختلف در سرتاسر جهان و ایران، میزان بقای متفاوتی را از این سرطان نشان داده است. از آنجایی که امار دقیق از میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در استان چهار محال بختیاری در دسترس نیست، این مطالعه به منظور برآورد میزان بقای مبتلایان به این سرطان در این استان طراحی و اجرا شد.

روش بررسی

این مطالعه از دسته مطالعه های مشاهده ای و نوع تحلیلی آن بوده است، که به روش طولی و مطالعه بقاء انجام شده است. انتخاب نمونه به روش سرشماری بوده و کلیه بیمارانی که در طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ تشخیص قطعی سرطان کولورکتال داده شده اند وارد مطالعه شده که این

بالای ۵۰ سال ۱۰۳ مورد (۳۴/۳ درصد) فوت شده و ۲۰۶ مورد (۷/۶۶ درصد) در قید حیات می باشند. در گروه سنی زیر ۵۰ سال میزان های بقا ۱، ۵ و ۱۰ ساله در این ها به ترتیب معادل ۹۶/۱، ۹۶/۸ و ۸۵/۹ هستند. درصد محاسبه شد. میانه بقا نیز در این گروه سنی به ترتیب 0.39 ± 0.76 سال محاسبه گردید. در گروه سنی بالای ۵۰ سال میزان های بقا ۱، ۵ و ۱۰ ساله در اینها به ترتیب معادل ۸۱/۶، ۸۱/۵ و ۴۵/۵ هستند. گزارش شد. میانه بقا نیز به ترتیب 0.41 ± 0.29 سال محاسبه شد. جدول ۲. میزان بقا و سرطان کولورکتال در دو زیر گروه سنی بالای ۵۰ و زیر ۵۰ سال با استفاده از آماره LOG RANK مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که میزان بقا و سرطان کولورکتال در افراد زیر ۵۰ سال بیشتر است و این از لحاظ آماری با مقدار $1.000/0.000$ $p=.$ معنی دار می باشد.

میزان بقا بر حسب جنس نیز به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفت که در حالت کلی از ۴۳۷ نفر مورد مطالعه ۲۱۳ نفر (۴۸/۷ درصد) زن و ۲۲۴ نفر (۵۳/۱ درصد) مرد بودند. از بین زنان ۶۸ نفر (۲۲ درصد) فوت شده و ۱۴۵ نفر (۴۸ درصد) در قید حیات می باشند. از بین مردان نیز ۵۹ نفر (۲۶/۳ درصد) فوت شده و ۱۶۵ نفر (۷۳/۷ درصد) در قید حیات می باشند.

در بین زنان میزان های بقا ۱، ۵ و ۱۰ ساله در اینها به ترتیب معادل ۸۵/۴، ۸۵/۳ و ۵۰/۱ درصد محاسبه شد.

کولورکتال ۵۹/۱۲ ± ۱۹/۹۹ سال و میانه سنی افراد نیز ۶۰ سال بوده است . کمترین سن ۲۰ سال و بیشترین سن ۸۹ سال بود. این سرطان در استان چهار محال بختیاری در دو گروه سنی زیر ۵۰ سال و بالای ۵۰ سال در طی یک دوره ۱۰ ساله بررسی شد. از این ۴۵۲ نفر، ۱۵ نفر اطلاعات مرگ نامشخص داشتند. از ۴۳۷ نفر باقیمانده با اطلاعات کامل ۱۲۸ نفر (۷۰/۷ درصد) زیر سن ۵۰ سال و ۳۰۹ نفر (۷۰/۷ درصد) بالای ۵۰ سال داشتند. در این مطالعه میزان بقا ۱ و ۱۰ ساله نیز مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به کسر ۱۵ موردی که اطلاعات مرگ نامشخص داشتند، از ۴۳۷ مورد باقیمانده ۱۲۷ نفر (۲۹/۱ درصد) فوت کرده و ۳۱۰ نفر (۷۰/۹ درصد) در قید حیات می باشند و به طور کلی بدون در نظر گرفتن ۱۵ مورد نامشخص، میزان های بقا ۱ و ۵ و ۱۰ ساله در آنها به ترتیب معادل ۸۵/۸، ۸۵/۹ و ۷۱/۹ هستند. درصد محاسبه شد و همچنان میانه بقا بر یکدیگر نیز به ترتیب 0.44 ± 0.26 سال محاسبه گردید. نتایج آنالیز حساسیت در حضور و عدم حضور ۱۵ نفر نیز در جدول ذکر شده است(جدول ۱).

در این مطالعه میزان بقا در دو گروه سنی زیر ۵۰ سال و بالای ۵۰ سال نیز مورد بررسی قرار گرفت که بدون در نظر گرفتن ۱۵ مورد ذکر شده ۱۲۸ مورد (۷۰/۷ درصد) زیر ۵۰ سال و ۳۰۹ مورد (۷۰/۹ درصد) بالای ۵۰ سال هستند که از گروه زیر ۵۰ سال ۲۴ مورد (۱۸/۷۵ درصد) فوت شده و ۱۰۴ مورد (۸۱/۲۵ درصد) در قید حیات می باشند و از گروه

آماره log rank نشان داد بین جنسیت با بقای سرطان کولورکتال رابطه معنی داری از لحاظ آماری وجود نداشت.

در بین مردان نیز میزان بقای ۱، ۵ و ۱۰ ساله به ترتیب معادل $۸۶/۲$ ، $۷۳/۷$ و $۵۴/۶$ درصد محاسبه شد.

میانه بقاء نیز در زنان به ترتیب $۷/۷۱ \pm ۰/۲۲$ سال و در مردان به ترتیب $۰/۴۰ \pm ۸/۷۰$ سال محاسبه شد.

جدول ۱: میزان و میانگین بقا سرطان کولورکتال طی سالهای ۱۳۸۰ - ۱۳۹۰ در استان چهارمحال و بختیاری

وضعیت	بدون احتساب ۱۵ نفر(درصد)	بهترین وضعیت(درصد)	بدترین وضعیت(درصد)
میزان بقای یکساله(درصد)	۸۵/۸	۸۶/۳	۸۶/۳
میزان بقای پنج ساله(درصد)	۷۱/۹	۷۲/۹	۷۲/۴
میزان بقای ده ساله(درصد)	۵۲/۵	۵۶/۲	۴۷/۲
میانه بقا (سال)	$۸/۴۴ \pm ۰/۲۶$	$۸/۶۳ \pm ۰/۲۵$	$۸/۱۷ \pm ۰/۲۵$
تعداد	۴۳۷	۴۵۲	۴۵۲
در قید حیات	۲۱۰	۲۲۵	۲۱۰
فوت شده(درصد)	(۲۹/۶)۱۲۷	(۲۸/۹)۱۲۷	(۳۱/۴)۱۴۲

جدول ۲: میزان و میانگین بقا سرطان کولورکتال طی سالهای ۱۳۸۰ - ۱۳۹۰ در استان چهارمحال و بختیاری بر حسب سن

سن	زیر ۵۰ سال	بالای ۵۰ سال
میزان بقای یکساله(درصد)	۹۶/۱	۸۱/۶
میزان بقای پنج ساله(درصد)	۸۵/۹	۶۵/۹
میزان بقای ده ساله(درصد)	۶۲/۸	۴۵/۵
میانه بقا (سال)	$۹/۷۶ \pm ۰/۳۹$	$۷/۴۱ \pm ۰/۲۹$
تعداد	۱۲۸	۳۰۹
در قید حیات	۱۰۴	۲۰۶
فوت شده تعداد(درصد)	(۱۸/۸)۲۴	(۳۴/۳)۱۰۳

جدول ۳: میزان و میانه بقاء سرطان کولورکتال طی سالهای ۱۳۸۰ - ۱۳۹۰ در استان چهارمحال و بختیاری بر حسب جنس

سن	مرد	زن
میزان بقای یکساله(درصد)	٪۸۶/۲	٪۸۵/۴
میزان بقای پنج ساله(درصد)	٪۳۷/۷	٪۶۶/۳
میزان بقای ده ساله(درصد)	٪۵۴/۶	٪۵۰/۱
میانه بقا (سال)	$۸/۷ \pm ۰/۴$	$۷/۷۱ \pm ۰/۳۲$
تعداد	۲۲۴	۲۱۳
در قید حیات	۱۶۵	۱۴۵
فوت شده تعداد(درصد)	۵۹	۶۸

بحث

۴۳ درصد و برای آمریکا ۶۵ درصد و برای استرالیا ۵۷ درصد برآورد کرده اند(۳۳). میزان بقای سرطان کولورکتال در سطح جهان تغییرات عمده‌ای دارد به طوری که میزان بقاء بر اساس مطالعه‌های انجام شده در سطح جهان بین ۱۳ تا ۶۶ درصد متغیر است(۱۶) و (جدول ۲). میزان بقاء در مناطق انگلستان، اروپا و ایالت متحده آمریکا با هم متفاوت هستند(۱۷) مطالعه‌های انجام شده در ایران نیز میزان بقای ۵ ساله را بین ۴۷ تا ۵۰ درصد به دست آورده‌اند(۱۹ و ۱۸). با توجه به موارد ذکر شده نشان دهنده بالا بودن میزان بقاء در مقاله حاضر نسبت به سایر مقالات می‌باشد. میزان‌های بقای ۱، ۵ و ۱۰ ساله در زنان به ترتیب معادل ۸۵/۴، ۸۶/۳ و ۵۰/۱ درصد محاسبه شد. در بین مردان نیز میزان بقای ۱، ۵ و ۱۰ ساله به ترتیب معادل ۸۶/۲، ۸۳/۷ و ۵۴/۶ درصد محاسبه شد. نتایج آنالیز تک متغیره نشان داد که میزان بقای سرطان کولورکتال بر اساس جنسیت رابطه معنی‌داری از لحاظ آماری ندارد(۰/۰۵<). نتایج مطالعه‌های مختلف داخلی و خارجی نیز با نتایج مطالعه حاضر همسو بوده و نشان دهنده بی‌تأثیر بودن جنسیت در بقای بیماران می‌باشد(۳۵-۳۲). البته این در حالی است که بعضی مطالعه‌ها عنوان کردند که میزان بقاء در زنان بهتر از مردان می‌باشد(۲۶ و ۱۷). میزان بقای سرطان کولورکتال در دو زیر گروه سنی بالای ۵۰ و زیر ۵۰ سال نشان داد. که میزان بقاء سرطان کولورکتال در افراد زیر ۵۰ سال بیشتر است و این از لحاظ آماری بود. مطالعه وکیلی و همکاران

با این که سرطان کولورکتال در سال‌های اخیر در بعضی مناطق روند نزولی داشته است(۳)، ولی با این حال سرطان کولورکتال سومین بدخیمی شایع و دومین سرطان کشنده در ایالت متحده آمریکا می‌باشد(۵). مطالعه حاضر جهت تعیین میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال در چهار محال و بختیاری انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که ۵۱/۳ درصد بیماران مذکور هستند و نسبت جنسی ۱/۰۵ درآورد شد. هر چند در مطالعه‌های دیگران این نسبت را در جنس مرد بیشتر برآورد کرده‌اند. به طوری که در مطالعه‌ی انجام شده در یزد این نسبت را ۱/۲(۲۷) در مطالعه‌ی دیگر این نسبت را ۱/۵۲ گزارش کرده است(۲۸). در مطالعه‌ای که در انگلستان انجام شده بود این نسبت را ۱/۲۷ بدست آورده بودند که میانگین سنی بیماران نسبت به بعضی مطالعه‌ها بیشتر و بعضی دیگر کمتر می‌باشد(۱۰، ۱۸ و ۲۹-۳۰). کمترین سن در مطالعه حاضر ۲۰ سال به دست آمد که با مطالعه انجام شده به وسیله سمنانی هم‌خوانی دارد(۳۰). همچنین کن و همکاران در مطالعه خود ۲/۵ درصد بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال را زیر ۴۰ سال گزارش کرده اند(۳۱). میزان‌های بقای ۱، ۵ و ۱۰ ساله در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال به ترتیب معادل ۸۵/۷، ۸۵/۹ و ۵۲/۵ درصد محاسبه شد. شیرزاد نصیری و همکاران میزان بقای ۵ ساله را ۴۷ درصد به دست آورده‌اند(۳۲). همچنین مطالعه‌های انجام شده در سایر کشورها این میزان را برای اروپا

نیز نشان داد که بقای سرطان کولورکتال در گروه
سنی زیر ۵۰ سال بیشتر است که این با مطالعه حاضر
همسو می‌باشد(۱۸).

از محدودیت‌های مطالعه می‌توان به ناقص
بودن اطلاعات و در دسترس نبودن شماره و آدرس
بعضی بیماران اشاره کرد.

نتیجه‌گیری

با این که میزان بقای سرطان کولورکتال در
استان چهار محال و بختیاری در حد مطلوب می‌باشد
با توجه به این که عوامل زیادی این میزان را تحت
تأثیر قرار می‌دهند، نیاز به مطالعه‌ای جهت شناسایی
عوامل پیش اگهی کننده بر روی آن می‌باشد.

تقدیر و تشکر

این مطالعه با حمایت مالی دانشگاه علوم
پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شده است.

REFERENCES

1. Aghajani H, Etemad K, Goya MM, Ramezani R, Modirian M, Nadali F. Iranian Annual Cancer Registration Report 2008-2009 Ministry Of Health & Medical Education Health DeputyCenter for disease control and prevention, Cancer Control Office. Tandis: 2011
- 2.Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Murray T, et al. Cancer statistics, 2008. CA: A Cancer Journal For Clinicians 2008; 58(2): 71-96.
- 3.Jemal A, Thun MJ, Ries LA, Howe HL, Weir HK, Center MM, et al. Annual report to the nation on the status of cancer, 1975–2005, featuring trends in lung cancer, tobacco use, and tobacco control. Journal of the National Cancer Institute. 2008; 100(23): 1672-94.
- 4.Mousavi SM, Gouya MM, Ramazani R, Davanlou M, Hajsadeghi N, Seddighi Z. Cancer incidence and mortality in Iran. Annals of Oncology 2009; 20(3): 556-63.
- 5.AB K, Semnani S, Roshandel G, Abvmrdany M .The relationship between nutrition and the risk of colorectal cancer in Golestan Province. Ournal of Gorgan University of Medical Sciences. 2009;11(2):38-44.
- 6.Safaei A, Fatemi S, Ghiyasi S, Zali M. Epidemiology of colorectal Cancer: Study the recorded cases in 1379- 86. TABIB SARGH 2007; 9(3): 209-16.
- 7.Fakheri H, Janbabai G, Bari Z, Eshqi F. The epidemiologic and clinical-pathologic characteristics of colorectal cancers from 1999 to 2007 in Sari, Iran. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences (JMUMS) 2008;18(67): 58-66.
- 8.Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer statistics. CA: A Cancer Journal For Clinicians 2011; 61(2): 69-90.
- 9.Pourhosseingholi M, Fazeli Z, Fazeli Bavndpvr F, ABDI A. Study of mortality from colorectal cancer in Iran during 1996-2004. Medical Science Journal of Islamic Azad University 2013; 23(1): 16-20.
- 10.Haggar FA, Boushey RP. Colorectal cancer epidemiology: incidence, mortality, survival, and risk factors. Clinics in Colon and Rectal Surgery 2009; 22(4): 191.
- 11.Boyle P, Langman J. colorectal cancer: Epidemiology. BMJ 2000; 321(7264): 805-8.
- 12.Janout V, Kollárová H. Epidemiology of colorectal cancer. Acta-Universitatis Palackianae Olomucensis Facultatis Medicinae 2001: 5-10.
- 13.Center MM, Jemal A, Ward E. International trends in colorectal cancer incidence rates. Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention 2009; 18(6): 1688-94.
- 14.Stone WL, Krishnan K, Campbell SE, Qui M, Whaley SG, Yang H. Tocopherols and the treatment of colon cancer .Annals of the New York Academy of Sciences 2004; 1031(1): 223-33.
- 15.Rembacken B, Fujii T, Cairns A, Dixon M, Yoshida S, Chalmers D, et al. Flat and depressed colonic neoplasms: a prospective study of 1000 colonoscopies in the UK. The Lancet 2000; 355(92): 4-1211.
- 16.Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P. Global cancer statistics, 2002. CA: A Cancer Journal For Clinicians 2005; 55(2): 74-108.
- 17.Burgess L. Colorectal cancer: epidemiology and genetics. In: SWAN E(editor). Colorectal Cancer: London; 2005; 27.
- 18.Vakili M, Aghakoochak A, Shiryazdi M, Pirdehghan A, Saffarmoghadam A. The Survival Rate of Patients with Colorectal Cancer in Yazd during 2001-2011. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences 2013; 23(3): 1187-95.
- 19.Ansari R, Amjadi H, Norozbeigi N, Zamani F, Mir-Nasseri M. Survival analysis of colorectal cancer in patients underwent surgical operation in shariati and mehr hospital-tehran, in a retrospective study. Govareh 2007; 12(1): 7-15.
- 20.Park YJ, Park KJ, Park J-G, Lee KU, Choe KJ, Kim JP. Prognostic factors in 2230 Korean colorectal cancer patients: analysis of consecutively operated cases. World Journal of Surgery 1999; 23(7): 721-6.
- 21.Takahashi K, Mori T, Yasuno M. Histologic grade of metastatic lymph node and prognosis of rectal cancer. Diseases of the Colon & Rectum 2000; 43(10): S40-S6.
- 22.Moghimi Dehkordi B, Safaei A, Zali M. Survival rates and prognostic factors in colorectal cancer patients. Journal of ilam University of Medical Sciences 2008;16(1): 33-42.
- 23.Brenner H, Bouvier AM, Foschi R, Hackl M, Larsen IK, Lemmens V, et al. Progress in colorectal cancer survival in Europe from the late 1980s to the early 21st century: the EUROCARE study. International Journal of Cancer 2012; 131(7): 1649-58.
- 24.Siegel R ,Naishadham D, Jemal A. Cancer statistics, 2012. CA: a Cancer Journal For Clinicians 2012; 62(1): 10-29.

- 25.Kesse E, Clavel-Chapelon F, Boutron-Ruault M-C. Dietary patterns and risk of colorectal tumors: a cohort of French women of the National Education System (E3N). American Journal of Epidemiology 2006; 164(11): 1085-93.
- 26.Fauci A. oncology. In: kasper, editor. Harrison's Principles of Internal Medicine Tehran: Antsharat Tymvrzad; 2008; 206-7.
- 27.Vakili M, Aghakoochak A, Shiryazdi M, Pirdehghan A ,Saffarmoghadam A. Paper: The survival rate of patients with colorectal cancer in yazd during 2001-2011.
- 28.Setoudehmanesh R, Aliasghary A. Epidemiology colorectal cancer in relation to age in Iran. Govaresh 2002; 36: 188-93.
- 29.Gomez D, Dalal Z, Raw E ,Roberts C, Lyndon P. Anatomical distribution of colorectal cancer over a 10 year period in a district general hospital: is there a true "rightward shift"? Postgraduate Medical Journal 2004; 80(949): 667-9.
- 30.Semnani S, Kazemnejat V, Abdollahi N. Epidemiological indicators of colorectal cancer in Gorgan city. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2004; 5(12): 13-8.
- 31.O'Connell JB, Maggard MA, Liu JH, Etzioni DA, Livingston EH, Ko CY. Rates of colon and rectal cancers are increasing in young adults. The American Surgeon 2003; 69(10): 866-72.
- 32.Nasiri shirzad SA, Karamnezhad M, Mehrkhani F, Mosafa S, Hedayat A. Prognostic factors in the survival rate of colorectal cancer patients after surgery. Iranian Journal of Surgery 2010; 50-56.
- 33.Gatta G, Ciccolallo L, Capocaccia R, Coleman M, Hakulinen T, Møller H, et al. Differences in colorectal cancer survival between European and US populations: the importance of sub-site and morphology. European Journal of Cancer 2003; 39(15): 2214-22.
- 34.Liang H, Wang X-N, Wang BG, Pan Y, Liu N, Wang DC, et al. Prognostic factors of young patients with colon cancer after surgery. World Journal of Gastroenterology 2006; 12(9): 1458.
- 35.Cusack JC, Giacco GG, Cleary K, Davidson BS, Izzo F, Skibber J, et al. Survival factors in 186 patients younger than 40 years old with colorectal adenocarcinoma. Journal of the American College of Surgeons 1996; 183(2): 105-12.
- 36.Wolters U, Stützer H, Keller H, Schröder U, Pichlmaier H. Colorectal cancer—a multivariate analysis of prognostic factors. European Journal of Surgical Oncology (EJSO) 1996; 22(6): 592-7.

Survival Rate of Patients with Colorectal Cancer in Charmahal and Bakhtiari Province, Iran, 2000- 2010

Rahimi Pordanjani S¹, Vakili M², Chahmatki F³, Ansari M⁴, Baeradeh NA^{5*}, Pourmohammadi B¹

¹Department of Public Health, School of Health, Semnan University of Medical Sciences, Semnan ,Iran,

²Department of Community Medicine, Shahid Sadooghi University of Medical Sciences,Yazd ,Iran,³Department of Environmental Health Engineering, Shahid Sadooghi University of Medical Sciences, Yazd,Iran, ⁴Department of General Medicine, Shahid Sadooghi University of Medical Sciences,Yazd,Iran,

⁵Department of Epidemiology and Biostatistics, Shahid Sadooghi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

Received: 17 Nov 2015 Accepted: 13 Feb 2016

Abstract

Background & Aim: Cancers are the second cause of death after cardiovascular diseases globally. Colorectal cancer is the third most prevalent cancer in the world. This cancer is the third leading cause of death in America and one of the most prevalent cancers of the gastrointestinal tract in Iran. The purpose of this study was to estimate the survival rate of patients with gastric cancer in Chaharmahal and Bakhtiari province, Iran.

Methods: The present observational (the analytical type) study was conducted using the longitudinal and survival study methods. The population study included all patients with gastric cancer in Chaharmahal and Bakhtiari province, Iran. The samples were selected by the census method and all the patients diagnosed with colorectal between the years 2000 to 2010 (estimated to be about 452 cases). After collecting the data and coding them, they were inserted into the SPSS 16 and STATA 12 software. To investigate the survival and the factors influencing the survival time of patients which was the main objective of this study, the Kaplan-Meier method was used. In order to compare the survival function in different subgroups, the log rank test or generalized Wilcoxon test was used.

Results: From the total 452 patients with colorectal cancer, 232 cases were male (51.3%) and 220 were females (48.7%), respectively. The mean age of patients was 59.12 ± 19.99 years at the time of diagnosis. The median age of patients was 60 years. The probability of survival at 1, 5 and 10 years after diagnosis of colorectal cancer in both sexes using the Kaplan-Meier was 85.7%, 71.9,% 52.5% respectively.

Conclusion: Although the survival rate of patients with colorectal cancer in Chaharmahal and Bakhtiari province was at a desirable level, the need for further studies to identify prognostic factors is essential.

Keywords: Colorectal cancer, Survival rate, Patients

*Corresponding Author: Baeradeh N, Department of Epidemiology and Biostatistics, Shahid Sadooghi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

Email: n.baerade@yahoo.com

Please cite this article as follows:

Rahimi Pordanjani S, Vakili M, Chahmatki F, Ansari M, Baeradeh NA, Pourmohammadi B. Survival Rate of Patients with Colorectal Cancer in Charmahal and Bakhtiari Province, Iran, 2000- 2010. Armaghane-danesh 2016; 20 (12): 1086-1095.