

تأثیر یک دوره تمرین هوایی موزون به همراه مصرف مکمل زنجیل بر سطوح سرمی TNF- α و IL-6 و مقاومت به انسولین زنان میان سال چاق مبتلا به دیابت ملیتوس

ابراهیم بنی طالبی^{۱*}، زهرا سادات افسر دیر^۲، مهدی غفاری^۱، محمود اسدی^۳

^۱ گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران، ^۲ گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران، ^۳ گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

تاریخ پذیرش: ۱۴۹۵/۱۰/۲۵ تاریخ وصول: ۱۴۹۶/۲/۵

چکیده

زمینه و هدف: دیابت ملیتوس ناهنجاری متابولیکی است که همراه با نوروفاتی، عوارض کلیوی، بیماری عروق محيطی، تصلب شرایین، فشارخون بالا و التهاب سیستمی است. استفاده از مکملها و عصاره‌های گیاهی و تمرین‌های ورزشی برای درمان بیماری‌ها و اختلالات متابولیک در بین مردم رواج یافته است، لذا هدف از این پژوهش بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوایی موزون به همراه مصرف مکمل زنجیل بر سطوح سرمی TNF- α و IL-6 و مقاومت به انسولین زنان میان سال چاق مبتلا به دیابت ملیتوس بود.

روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی تعداد ۴۶ زن چاق دیابتی ($BMI \geq 20$) و قندخون ناشتا (۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر) با دامنه سنی ۴۵ تا ۶۰ سال انتخاب و به طور تصادفی به چهار گروه دریافت کننده زنجیل (۱۲ نفر)، تمرین‌های هوایی به همراه مکمل زنجیل (۱۲ نفر)، تمرینات هوایی (۱۲ نفر) و دارونما (۱۰ نفر) تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه‌های مکمل به مدت ۱۰ هفته روزانه چهار عدد کپسول ۲۵۰ میلی‌گرمی حاوی عصاره زنجیل دریافت نمودند. برنامه تمرین هوایی موزون شامل: ۱۰ هفته تمرین، هر هفته، سه جلسه و هر جلسه ۶۰ دقیقه بود که با ۵۵ درصد ضربان قلب بیشینه در هفته اول شروع و به تدریج با پیشرفت برنامه تمرینی به ۷۵ درصد ضربان قلب بیشینه رسید. هر جلسه تمرین شامل: گرم کردن (۱۰ دقیقه)، بخش اصلی تمرین شامل اجرای حرکات ایرووبیک در حالت ایستاده (۴ دقیقه) و برگشت حالت اولیه به حالت نشسته (۱۰ دقیقه) بود. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های آماری کلموگروف اسپیرونف، تحلیل واریانس یک‌طرفه و تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: علی‌رغم عدم تفاوت معنی‌دار در تغییرات چهار گروه در میزان TNF- α و IL-6، اما بین پیش‌آزمون‌ها و پس آزمون‌ها کاهش معنی‌داری در گروه تمرین + زنجیل، در سطوح TNF- α (p=0.028)، IL-6 (p=0.012)، مقاومت به انسولین (p=0.009)، انسولین (p=0.007) و گلوکز ناشتا (p=0.0001) سرم وجود داشت.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد، مصرف همزمان مکمل زنجیل و انجام تمرین‌های هوایی می‌تواند تأثیر مثبتی بر سطوح سرمی عوامل التهابی زنان چاق دیابتی نوع ۲ داشته باشد.

واژه‌های کلیدی: تمرین‌های هوایی موزون، دیابت ملیتوس، TNF- α ، IL-6، مکمل زنجیل

*نویسنده مسئول: ابراهیم بنی طالبی، شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تربیت بدنی
Email:banitalebi.e@gmail.com

مقدمه

می‌یابد و به صورت خیلی قوی با درجه چاقی و سطح مقاومت انسولینی در حیوانات چاق و انسان همبستگی دارد^(۵). α -TNF از طریق توانایی اش در کاهش فعالیت تیروزین کیناز گیرنده انسولین مسیر سیگنالی انسولین را کاهش می‌دهد. در آدیپوسیت α -TNF بیان چندین پروتئین که در مسیر سیگنالی انسولین هستند مانند: انتقال دهنده گلوگز نوع ۴ (GLUT4)^(۳) و گیرنده تکثیر فعال پراکسی گاما (PPAR γ)^(۴) را تنظیم منفی می‌کند^(۶). α -TNF می‌تواند مقاومت انسولینی را با راههای بسیاری نظیر تحریک لیپولیز آدیپوسیت، ایجاد کند به گونه‌ای که سطح اسید چرب در گردش افزایش یابد که به نوبه خود موجب تغییر عملکرد انسولین می‌شود^(۷).

IL-6 ایتوکاین ۲۱۲ اسید آمینه‌ای است که در فرایندهای بیولوژیکی همچون پاسخ‌های التهابی و ایمنی در گیر است^(۸). IL-6 اغلب به عنوان سایتوکاین پیش التهابی طبقه بندی می‌شود، اگرچه آثار ضدالتهابی نیز دارد^(۹). افزایش سطح سرمی IL-6 با چاقی و مقاومت انسولینی و ارتباط مثبت با BMI گزارش شده است (استファン و کروک، استファン و همکاران).....(فرنس). IL-6 به مقدار زیادی به وسیله بافت‌چربی شکمی می‌تواند تولید شود. به علاوه سطوح پلاسمایی بالای IL-6 با مقاومت انسولینی و افزایش خطر دیابت، مستقل از وزن بدن، همراه است^(۱۰).

دیابت ملیتوس ناهنجاری متابولیکی است که با کاهش ترشح انسولین مشخص می‌شود و منجر به بالا رفتن گلوکز پلاسمایی شود. بیماری دیابت را بیماری قند نیز می‌نامند که علت این نام‌گذاری به مزه شیرین ادرار بیماران دیابتی مرتبط است^(۱). هزینه‌های ناشی از دیابت در ایران در سال ۲۰۰۹، ۳۷۸ میلیارد دلار آمریکا براورد شد^(۱). بیش از ۹۰-۹۵ درصد بیماران دیابتی مبتلا به دیابت ملیتوس هستند^(۲).

در آسیب‌شناسی دیابت، التهاب سیستمی نیز درگیر است^(۳). از بافت‌چربی و عضلانی سایتوکاین‌هایی ترشح می‌شوند که در بروز مقاومت انسولین نقش دارند. یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد نشانگرهای التهابی مانند اینترلوکین-6 (IL-6)، فاکتور نکروزدهنده الفا (TNF- α)^(۲) در افراد چاق و نیز افراد مبتلا به دیابت و سذرم متابولیکی به مقدار زیادی تولید می‌شوند. هم‌چنین پیشنهاد شده است تولید مقادیر زیاد سایتوکاین‌های التهابی به وسیله بافت‌چربی در توسعه مقاومت انسولینی که در آن سلول‌های بدن پاسخ مناسبی به انسولین نمی‌دهند و به دنبال آن جذب گلوکز دچار اختلال شده، می‌شود^(۲).

TNF- α به عنوان اولین سایتوکاینی شناخته شده است که می‌تواند موجب مقاومت انسولینی شود و ارتباط مولکولی بین چاقی و مقاومت انسولینی برای آن پیشنهاد شده است^(۴). بیان α -TNF با چاقی افزایش

1- Interleukin 6

2- Tumor Necrosis Factor- α

3- Glucose transporter type 4

4- Peroxisome proliferator-activated receptor gamma

صرف زنجیل، متابولیسم چربی را از طریق افزایش بیوسنتر اسید صفرا تغییر می‌کند که موجب زودهن کاسترول از بدن و افزایش دفع کلسترول از راه مدفعه، بازداری بیوسنتر(سنتر بیولوژیکی) کلسترول سلولی می‌شود^(۵). نتایج تحقیق‌های مختلف باعث شد تا دیدگاه‌های جدیدی نسبت به اثرات زنجیل بر متابولیسم بدن و فواید آن در پیشگیری یا درمان دیابت و مکانیسم‌های مربوطه ارایه گردد^(۱۱). برای نمونه آراییان و همکاران به بررسی تأثیر مصرف مکمل زنجیل بر برخی از عوامل خطر بیماری‌های قلبی - عروقی در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس پرداختند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد زنجیل سبب کاهش قند خون ناشتا، برخی از فراکسیون‌های چربی خون و پروتئین واکنش‌پذیر C در بیماران دیابتی نوع ۲ می‌شود و برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی-عروقی در این بیماران مفید است^(۱۱). در پژوهش طلایی و همکاران که بر روی ۸۱ بیمار مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد، نتایج نشان داد مصرف روزانه ۳ گرم پودر زنجیل به مدت هشت هفته، سبب کاهش قند خون ناشتا می‌شود^(۳). شان موگان و همکاران مشاهده کردند که زنجیل سبب کاهش معنی‌داری در قند خون موش‌های دیابتی در مقایسه با موش‌های شاهد دیابتی شد^(۱۲).

در ارتباط با مصرف همزمان زنجیل و انجام فعالیت بدنه بلک و همکاران تأثیرات کوتاه‌مدت مصرف ۲ گرم زنجیل خوراکی بر درد عضلانی، التهاب و ناتوانی ناشی از تمرين‌های برون‌گرا را

برای چندین دهه، ورزش به عنوان اساس مدیریت دیابت همراه با دارو و رژیم غذایی در نظر گرفته شده است. مدارک زیادی وجود دارد که نشان می‌دهند فعالیت جسمانی ابزار درمانی مؤثر برای پیشگیری و درمان نوع ۲ است. کاهش ۶۰ درصدی خطر توسعه دیابت در افراد مبتلا به اختلال در تحمل گلوکز با ورزش کردن گزارش شده است^(۱۱). نتایج نشان داد مقدار BMI، تری‌گلیسرید و TNF-α پس از این برنامه به طور معنی‌داری کاهش یافت^(۱۲). تمرين ورزشی در کاهش TNF-α، گیرنده‌های محلول آن و مولکول‌های چسبنده در افراد بیمار؛ نظیر افراد مبتلا به اختلال در تحمل گلوکز^(۱۳) یا نارسایی مزمن قلب^(۱۴) مؤثر است و کاهش آن با بهبود آمادگی هوایی مرتبط است^(۱۵). در افراد چاق سالم یافته‌های متناقضی در مورد تأثیر تمرين ورزشی بر آدیپوکاین‌ها گزارش شده است. تمرين کوتاه‌مدت^(۱۲) هفت‌هایی، باشد کم تا متوسط سطوح (TNF-α، IL-6 و CRP) را در دختران یا زنان چاق^(۱۲) تغییر نداد. با این حال تمرين بلندمدت^{(۷) ماه} در شدت و تکرار بالاتر، وزن بدن، چربی بدن، CRP و TNF-α را کاهش داد^(۱۹).

از طرف دیگر، در حال حاضر استفاده از مکمل‌ها و عصاره‌های گیاهی برای درمان بیماری‌ها و اختلالات متابولیک در بین مردم رواج یافته است. زنجیل (Zingiber officinal Roscoe, Zingiberaceae)، به عنوان ادویه، به صورت گستردۀ در سراسر جهان به کار می‌رود. برخی از مطالعه‌ها نشان داده‌اند

زنجبیل را به صورت مستقل ارزیابی کرده‌اند و مطالعه‌ای که به صورت همزمان آثار مصرف مکمل زنجیل و تمرین هوازی را بر عوامل التهابی در زنان چاق دیابتی نوع ۲ مورد بررسی قرار دهد، وجود ندارد، لذا هدف از تحقیق حاضر ارزیابی تأثیر یک‌دوره تمرین هوازی موزون بهمراه مصرف مکمل زنجیل بر سطوح سرمی TNF- α و IL-6 و مقاومت به انسولین زنان میان‌سال چاق مبتلا به دیابت ملیتوس است.

روش بررسی

تحقیق از نوع نیمه‌تجربی است. جامعه آماری تحقیق کلیه زنان دیابتی نوع ۲ چاق ($BMI \geq 30$) شهرستان شهرکرد بودند. نمونه آماری پژوهش ۴۸ نفر از زنان چاق دیابتی با دامنه سنی ۴۵-۶۰ سال بودند که به صورت هدفمند گزینش و به طور تصادفی در چهار گروه، عصاره زنجیل (۱۲ نفر) تمرین ایروبیک + عصاره زنجیل (۱۲ نفر) تمرین هوازی (۱۲ نفر) کنترل (۱۲ نفر) قرار گرفتند. در این تحقیق افراد انتخاب شده با شرایط بالا سابقه بیماری خاص (سکته قلبی، آریتمی کنترل نشده، عوارض مربوط به دیابت مانند زخم پای دیابتی و نفروپاتی) یا فعالیت بدنی منظم نداشتند، سیگار نمی‌کشیدند و از رژیم غذایی و شیوه درمانی خاصی استفاده نمی‌کردند و برای شروع فعالیت بدنی آمادگی لازم را داشتند. این موارد با پرسشنامه سابقه پزشکی و پرسشنامه آمادگی برای شروع فعالیت بدنی مورد ارزیابی قرار گرفت.

بررسی کردند. نتایج نشان داد خوردن زنجیل سبب هیچ تفاوت معنی‌داری در شدت درد، حجم بازو و دامنه حرکتی نمی‌شود(۱۶). همچنین ادیت و همکاران استفاده از تردیمیل را به مدت یک هفته در دوندگان فوق مارaten بررسی کردند و متوجه شدند مکمل زنجیل نمی‌تواند مانع افزایش IL-6 شود(۱۷). دبیدی روشن و همکاران نشان دادند مصرف مکمل زنجیل قبل از اجرای فعالیت‌های ورزشی یک روش درمانی جایگزین برای مهار افزایش و یا تخفیف اثرات التهابی و استرسی ناشی از پروتکل تمرینی سنگین است(۱۸). آتشک و همکاران نشان دادند مصرف طولانی مدت زنجیل و تمرین‌های مقاومتی می‌تواند شیوه درمانی مؤثری برای تغییرات مطلوب در پراکسیداسیون لیپیدی و مقاومت به انسولین در مردان چاق باشد(۱۹). پادروند و همکاران نشان دادند که تمرین‌های استقامتی پیش‌رونده سبب افزایش فعالیت آنزیمهای لاکتات دی‌هیدروژناز و کراتین کیناز و می‌شود و مصرف روزانه مکمل زنجیل می‌تواند آسیب عضلانی ناشی از این نوع تمرین‌ها را کاهش دهد(۲۰) افshan و همکاران نشان دادند تمرین‌های بدنی توأم با مکمل زنجیل موجب کاهش شاخصه‌ای التهابی می‌شود(۲۱).

با توجه به نقش افزایش التهاب در ایجاد دیابت از یک‌طرف و همین‌طور اثرات ضدالتهابی فعالیت‌های بدنی منظم از طرف دیگر و نیز اثرات سودمند زنجیل در کاهش عوارض دیابت ملیتوس و با توجه به این‌که بیشتر مطالعه‌های انجام شده تأثیر

طريق کیت الایزا ساخت کشور آمریکا کمپانی Boster با حساسیت ۱ پیکوگرم بر میلی لیتر cat number: EK0525, Human TNF alpha PicoKine) سطوح ۶-۱۱ ELISA Kit و سرمه از طریق کیت الایزا ساخت کشور آمریکا کمپانی Boster با حساسیت ۰.۳ پیکوگرم بر میلی لیتر cat number: EK0410, Human IL-6 PicoKine) ارزیابی شد.

از آزمودنی‌ها خواسته شد به مدت ۱۰ هفته با حفظ رژیم غذایی ثابت، روزانه ۴ کپسول عصاره زنجیل ۲۵۰ میلی‌گرمی را پس از هر وعده غذایی اصلی مصرف نمایند. کپسول‌های زنجیل (زینتوما) از شرکت فراورده‌های دارویی گیاهی گل دارو با مجوز بهداشتی ۱۲۲۸۰۲۲۷۷۷IRC از اداره کل نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت تهیه شد^(۱۹). هم‌چنین برای گروه کنترل، کپسول‌های حاوی آرد بوداده گندم که شکل ظاهری آن شبیه کپسول‌های مکمل زنجیل بود. تهیه شد^(۲۰).

برنامه تمرین هوازی شامل ۱۰ هفته تمرین، هر هفته ۳ جلسه و هر جلسه ۶۰ دقیقه بود که با ۵۵ درصد ضربان قلب بیشینه در هفته اول شروع و به تدریج با پیشرفت برنامه تمرینی به ۷۵ درصد ضربان قلب بیشینه رسید. هر جلسه تمرین شامل کرم کردن (۱۰ دقیقه)، بخش اصلی تمرین شامل اجرای حرکات ایرووبیک در حالت ایستاده (۴۰ دقیقه) و برگشت به حالت اولیه به صورت نشسته (۱۰ دقیقه) بود (۲۲).

آزمودنی‌ها ۲۴ ساعت قبل از آزمایش متغیرهای بیوشیمیایی، جهت اندازه‌گیری ترکیب بدنی و عوامل آمادگی جسمانی مورد ارزیابی قرار گرفتند که وزن بدن با استفاده از ترازوی دیجیتالی مدل ساروس ساخت کشور آمریکا با دقت ۱/۰ کیلوگرم، قد با استفاده از قد سنج مدل ساروس با دقت ۱/۰ سانتی‌متر اندازه‌گیری شد. نسبت دور کمر به دور باسن (WHR)، مقایسه محیط کمر به دور باسن است. برای محاسبه درصد چربی از روش اندازه‌گیری ضخامت چربی زیرپوستی در سه نقطه شکم، فوق خاصره و سه سر بازو و با استفاده از کالیپر ضخامت چربی زیرپوستی استفاده شد. درصد چربی با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید. این تحقیق به وسیله کمیته اخلاق معاونت پژوهشی دانشگاه شهرکرد مورد تایید قرار گرفت.

.....۹۲۴۰ (X) +۲۵ (X)^۲ -۹۷۹ (سـن)

$$\text{چگالی بدن} = \frac{495}{\text{چربی درصد}} - 450$$

برای اندازه‌گیری آمادگی قلبی تنفسی از آزمون پیاده‌روی یک مایل راکپورت^(۱) استفاده گردید. برای انجام این آزمون فرد باید قادر باشد مسافت یک مایل را تند پیاده‌روی کند (ضریبان قلب را بالای ۱۲۰ ضربه در دقیقه برساند). در هر گروه، یک پیش‌آزمون گرفته شد. به این صورت که خون‌گیری از افراد انجام و سپس سانتریفیوژ شده پلاسمای خون آن‌ها نگهداری شد و پس از ۱۰ هفته مداخلات، مجدداً از افراد خون‌گیری انجام گرفت. سطوح TNF-α سرمی از

باسن، $V_{O_2\text{max}}$ به دنبال مداخلات مختلف در جدول ۱ آمده است.

همان طور که در جدول ۱ مشاهده می‌شود نتایج آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه نشان می‌دهد اختلاف معنی‌داری بین تغییرات وزن ($p=0.0001$)، BMI ($p=0.0001$)، درصد چربی بدن ($p=0.0001$)، $V_{O_2\text{max}}$ ($p=0.0001$)، بین گروه‌ها مشاهده شد. هم‌چنین تغییرات درون‌گروهی، در گروه‌های تجربی تقاضوت معنی‌داری در وزن، BMI ، درصد چربی بدن، محیط دور کمر، محیط دور باسن و $V_{O_2\text{max}}$ معنی‌دار بود.

همان طور که در جدول ۲ مشاهده می‌شود نتایج آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه نشان داد اختلاف معنی‌داری بین مقاومت به انسولین ($p=0.007$)، انسولین ($p=0.001$)، گلوکز ناشتاپی ($p=0.001$) بین گروه‌ها مشاهده شد. بین تأثیر مداخلات مختلف اختلاف معنی‌داری در میزان IL-6، TNF- α وجود ندارد ($p=0.324$)، هم‌چنین بین تأثیر مداخلات مختلف اختلاف معنی‌داری در میزان IL-6 وجود ندارد ($p=0.084$). همچنین تغییرات درون‌گروهی، در گروه‌های تجربی تقاضوت معنی‌داری در گلوکز ناشتاپی مشاهده شد، اما تغییرات IL-6، TNF- α ، تمرین + زنجیل (به ترتیب 0.028 و 0.012 و $p=0.0001$) مقاومت به انسولین و تغییرات انسولین فقط در گروه معنی‌دار بود.

بیشینه و به وسیله ضربان سنج پولار این گونه بود که از فرمول سن-۲۲۰ ضربان قلب بیشینه و درصد ضربان قلب هدف در هر جلسه از فرمول کارونن به دست آمد.

ضربان قلب استراحت + شدت فعالیت × ضربان، قلب ذخیره = ضربان قلب هدف پس از ۱۰-۱۲ ساعت ناشتاپی شبانه، آزمودنی‌ها رأس ساعت ۸ صبح در محل خون‌گیری حاضر شدند و نمونه خون اولیه به میزان ۱۰ سی‌سی از ورید قدامی بازویی به وسیله متخصصین خون‌گیری آزمایشگاه از آن‌ها گرفته شد. پس از آن که نمونه خون سانتریفوژ شد، نمونه سرمی آن جدا شد. سطح انسولین سرم با روش ELISA و غلاظت گلوکز با استفاده از کیت گلوکز اندازه‌گیری شد. پس از جمع آوری داده‌های اولیه، برنامه تمرین از روز بعد به مدت ۱۰ هفته آغاز گردید. بعد از اتمام دوره تمرین، ۴۸ ساعت پس از آخرین جلسه تمرین مجدداً اندازه‌گیری آنتروپومتریک و آزمایشگاهی در شرایط و زمان مشابه آزمون‌های اولیه و با همان ابزار به وسیله محقق و متخصص آزمایشگاه انجام شد. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری کولموگروف اسمیرونف، واریانس یک‌طرفه آنوا و تست تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها

تغییرات وزن، BMI ، درصد چربی بدن، محیط دور کمر، محیط دور باسن، نسبت محیط کمر به

جدول ۱: تغییرات ویژگی‌های متغیرهای تحقیق در درون گروه‌ها و بین گروه‌ها

	متغیرها	گروه	زنجبیل	زنجبیل+تمرين	تمرین	کنترل	سطح معنی‌داری بین گروهی
•/•••xx	وزن (کیلوگرم)	پیش آزمون	۸۰/۱۲±۶/۷۸	۸۳/۸۳±۱۳/۰۱	۸۴/۷۵±۸/۱۰	۸۶/۳۰±۱۱/۳۳	۸۰/۰۰۰xx
	شاخص توده بدن (BMI) (زن به کیلوگرم بر مذکور قد به متر)	پس آزمون	۷۷/۵۸±۶/۴۴	۸۰/۲۵±۱۳/۱۰	۸۲/۸۲±۸/۱۴	۸۵/۴۰±۱۱/۴۷	۰/۲۲۳
	سطح معنی‌داری درون گروهی	پیش آزمون	۳۲/۶۰±۱/۸۴	۳۳/۹۶±۴/۳۲	۳۱/۵۰±۲/۰۴	۳۴/۶۱±۴/۸۶	۰/۰۰۰xx
	پیش آزمون	پس آزمون	۳۱/۶۹±۱/۸۱	۳۲/۴۹±۴/۶۰	۳۰/۶۴±۲/۰۵	۳۴/۴۴±۴/۹۱	۰/۰۰۰xx
	سطح معنی‌داری درون گروهی	پیش آزمون	۲۲/۵۸±۲/۷۷	۲۷/۹۴±۲/۷۳	۲۷/۹۹±۲/۳۶	۲۱/۵۱±۲/۹۶	۰/۰۰۰xx
	چربی بدن (درصد)	پیش آزمون	۲۷/۴۳±۲/۸۲	۲۲/۲۸±۳/۲۶	۲۱/۲۲±۴/۶۳	۲۳/۱۸±۲/۵۱	۰/۰۰۰xx
•/•••xx	محیط دور کمر (سانتی‌متر)	پیش آزمون	۹۱/۰۸±۲۹/۴۵	۹۹/۰۸±۷/۴۸	۹۶/۴۱±۱۱/۲۲	۱۰۰/۰۵±۸/۴۳	۰/۰۶۵
	محیط دور باسن (سانتی‌متر)	پیش آزمون	۸۷/۳۴±۲۸/۶۰	۹۳/۵۰±۹/۰۸	۹۲/۳۲±۹/۸۹	۱۰۰/۶۰±۸/۴۷	۰/۲۴
	سطح معنی‌داری درون گروهی	پیش آزمون	۱۰۰/۶۶±۲۴/۳۰	۱۰۷/۹۱±۱۴/۰۴	۱۰۷/۹۱±۱۴/۶۷	۱۱۶/۱۰±۹/۵۱	۰/۳۴
	پیش آزمون	پس آزمون	۱۱۴/۱۲±۱۴/۶۵	۱۱۳±۱۳/۸۱	۱۱۲±۱۴/۶۵	۱۱۶/۱۰±۹/۵۱	۰/۳۴
	سطح معنی‌داری درون گروهی	پیش آزمون	۰/۰۱۲*	۰/۰۰۲*	۰/۰۰۴*	۱۰۰/۰۵±۸/۴۳	۰/۳۶۵
	نسبت محیط کمر به باسن	پیش آزمون	۰/۰۸۰*	۰/۰۷۰*	۰/۰۸۰*	۱۱۶/۱۰±۹/۵۱	۰/۳۶۵
•/•۶۰۲	Vo _{2max} (میلی‌لیتر بر کیلوگرم در دقیقه)	پیش آزمون	۱۵/۱۲±۱/۴۸	۱۴/۶۴±۱/۴۲	۱۴/۸۲±۱/۵۹	۱۲/۵۴±۱/۳۹	۰/۱۳۸
	سطح معنی‌داری درون گروهی	پیش آزمون	۱۶/۸۸±۱/۶۱	۱۶/۲۸±۱/۶۷	۱۵/۸۴±۱/۵۳	۱۲/۳۳±۱/۴۱	۰/۰۰۰xx
	سطح معنی‌داری درون گروهی	پیش آزمون	۰/۰۵۶	۰/۱۰۱	۰/۸۸	۰/۲۴	۰/۰۰۰xx
	پیش آزمون	پس آزمون	۰/۰۷۶*	۰/۰۰۷*	۰/۰۵۰*	۰/۸۶±۰/۰۴۸	۰/۰۰۰xx
	پیش آزمون	پس آزمون	۰/۰۷۹*	۰/۰۸۰*	۰/۰۸۰*	۰/۸۷±۰/۰۴۸	۰/۰۰۰xx
	نسبت محیط کمر به باسن	پیش آزمون	۰/۰۷۹*	۰/۰۷۰*	۰/۰۷۰*	۰/۰۷۸*	۰/۰۰۰xx

^{*} معنی‌داری در سطح $\alpha \leq 0/05$

جدول ۲- تغییرات ویژگی‌های متغیرهای تحقیق در درون گروه‌ها و بین گروه‌ها

	متغیرها	گروه	زنجبیل	زنجبیل+تمرين	تمرین	کنترل	سطح معنی‌داری بین گروهی
•/••**	مقاومت به انسولین	پیش آزمون	۳/۲۴±۳/۰۸	۲/۸۰±۱/۹۰	۲/۷۶±۲/۳۰	۵/۲۳±۴/۴۵	۰/۰۰۱**
	HOMA-IR	پس آزمون	۳/۱۳±۴/۹۲	۱/۸۷±۱/۲۵	۲/۰۱±۰/۸۶	۵/۳۵±۴/۴۲	۰/۰۰۱**
	سطح معنی‌داری درون گروهی	پیش آزمون	۸/۰۷±۶/۵۶	۷/۹۲±۴/۴۸	۰/۱۰۸	۰/۰۴۶	۰/۰۰۱**
	انسولین	پس آزمون	۶/۴۲±۷/۷۵	۵/۰۰±۲/۰۹	۵/۸۲±۲/۷۱	۱۱/۱۲±۲/۷۱	۰/۰۰۷**
	میکرومول بر میلی لیتر	پس آزمون	۰/۰۵۸۶	۰/۰۰۷۳	۰/۰۱۴۸	۰/۰۳۶۷	۰/۰۰۷**
	گلوكز ناشتابی	پیش آزمون	۲۲۱/۰۰±۶۹/۳۳	۱۷۵/۵۰±۶۲/۶۰	۱۷۵/۷۰±۷۴/۶۸	۱۹۲/۷۰±۷۴/۶۸	۰/۰۰۱**
•/•۰۱**	(میلی‌گرم در دسی لیتر)	پس آزمون	۱۳۶/۳۰±۵۴/۹۴	۶۷۱/۹۰±۴۹/۳۶	۱۴۷/۳۰±۴۷/۴۵	۲۰۰/۰۰±۹۸/۳۸	۰/۰۰۱**
	سطح معنی‌داری درون گروهی	پیش آزمون	۰/۰۰۱۱*	۰/۰۰۰۱*	۰/۰۰۳۲*	۰/۰۰۸۲	۰/۰۰۱**
	پیش آزمون	پس آزمون	۳۰/۰۹±۵/۶۵	۲۷/۸۴±۳/۵۸	۳۳/۲۸±۲/۵۲	۹/۸۹±۷/۵۲	۰/۰۰۷**
	TNF-α (پیکوگرم / میلی لیتر)	پس آزمون	۰/۴۳۲	۰/۰۲۸*	۰/۱۱۴	۰/۰۵۰	۰/۰۳۲۴
	IL-6 (پیکوگرم / میلی لیتر)	پیش آزمون	۱۲/۷۵±۶/۲۶	۱۸/۳۴±۴/۲۴	۱۴/۱۱±۴/۹۷	۲۲/۰۵±۹/۹۶	۰/۰۸۴
	سطح معنی‌داری درون گروهی	پیش آزمون	۰/۰۶۸	۰/۰۱۲*	۰/۰۵۵	۰/۰۸	۰/۰۸۴

^{*} معنی‌داری در سطح $\alpha \leq 0/05$

بحث

در گروه تجربی در مقایسه با دارونما به کاهش مقادیر α -TNF در مرحله استراحت، بلا فاصله و ۲۴ ساعت پس از اتمام پروتکلهای تمرین مقاومتی منجر شد که در مقایسه با دارونماهای مربوطه از لحاظ آماری معنی دار نبود(۲۱). که همسو با نتایج حاضر هست. نتایج به دست آمده در این مطالعه همسو با مطالعه بلومر و همکاران بود که نشان داد دریافت روزانه مکمل دگروهگرانیک اسید(DHA) به کاهش مقادیر سایتوکین ها نسبت به دوره قبل از مکمل گیری منجر شد(۲۵) و اسیلاکوپلیس و همکاران در مطالعه ای اثر یک مکمل دهی ضد اکسایشی ترکیبی را روی تغییرهای غلظت سرمی α -TNF در شش آزمودنی بررسی کردند. نتایج نشان داد مصرف مکمل به طور معنی داری به کاهش غلظت سرمی α -TNF منجر می شود. آتشک و همکاران، بلک و همکاران و تریپاتی و همکاران کاهش التهاب را بعد از مصرف مکمل زنجیل گزارش دادند(۲۶ و ۲۷). در پژوهش حاضر مصرف مکمل ضد التهابی زنجیل به کاهش مقادیر سایتوکین های مذکور نسبت به دوره قبل از تمرین شد. بنابراین مصرف مکمل زنجیل متعاقب اجرای پروتکلهای تمرین استقاماتی مذکور که با تولید رادیکال های آزاد و گونه های فعال اکسیژن همراه است، منجر به کاهش تولید سایتوکین ها از طریق اثر بر خنثی سازی تولید رادیکال های آزاد و گونه های فعال اکسیژن و همچنین مهار فعالیت مسیرهای انتقال سیگنال حساس به اکسایش و کاهش شده، به احتمال

در تحقیق حاضر پس از ۱۰ هفته تمرین هوازی موزون (ایروبیک) و مصرف مکمل زنجیل در ۳ گروه (زنジبل، تمرین و ترکیبی زنجیبل+تمرین) وزن، BMI، درصد چربی(BFدرصد) و گلوکز ناشتا کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل نشان داد، در حالی که کاهش معنی داری در نسبت دور کمر به باسن(WHR) در بین گروه های تمرین، زنجیبل و گروه ترکیبی مشاهده نشد. همچنین $VO_{2\text{max}}$ در هر سه گروه در مقایسه با گروه کنترل، با افزایش معنی دار همراه بود. پس از ۱۰ هفته مصرف زنجیبل مقدار انسولین و مقاومت به انسولین با کاهش معنی داری همراه نبود، اما همراه با تمرین ۱۰ هفته ای این کاهش معنی دار بود. همچنین، نتایج تحقیق حاضر نشان داد پس از ۱۰ هفته تمرین+صرف مکمل زنجیبل میزان α -TNF سرم در پس آزمون نسبت به پیش آزمون به طور معنی داری کاهش یافت، اما در مقایسه با گروه تمرین و کنترل این تفاوت معنی دار نبود. در تحقیقی که توسط جانکرد و جمیولو انجام شد، تأثیر فعالیت بدنه بر غلظت α -TNF و α -IL-6 در مردان مسن سالم ارزیابی شد. نتایج نشان داد افراد گروه با فعالیت سنگین در مقایسه با گروه با فعالیت سبک کاهش سطح α -IL-6 و افزایش سطح α -IL-10 را نشان دادند. در نتیجه ورزش نقش حیاتی در کنترل شاخص های التهابی بازی می کند(۲۸). همچنین، افشار و همکاران نشان دادند مکمل گیری یک هفتاهی زنجیبل

مطالعه و وضعیت تمرينی شرکت‌کنندگان و ترکیبی از عوامل فوق (۳۵ و ۳۶).

در خصوص اثر استفاده از زنجیل و تأثیر آن بر قند خون در پژوهش طلایی و همکاران که بر روی ۸۱ بیمار مبتلا به دیابت ملیتوس انجام شد، نتایج نشان داد مصرف روزانه ۳ گرم پودر زنجیل به مدت هشت هفته، سبب کاهش قند خون ناشتا می‌شود (۲). شان موگان و همکارانش مشاهده کردند که زنجیل سبب کاهش معنی‌داری در قند خون موش‌های دیابتی در مقایسه با موش‌های شاهد دیابتی شد (۱۲). در تحقیق دیگری که به وسیله آریاییان و همکاران صورت گرفت مشاهده شد مصرف زنجیل سبب کاهش معنی‌دار قند خون ناشتا گردید (۳۷) که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد.

در مقابل در پژوهش محلوبی و همکاران دیده شد که مصرف ۲ گرم زنجیل در روز به مدت دو ماه تأثیری بر میزان قند خون ناشتا نداشت، ولی می‌تواند انسولین سرم و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) را کاهش دهد (۲۴). که این نتایج با نتایج تحقیق حاضر همخوانی ندارد. علت تناقض در یافته‌های مطالعه‌های انجام شده در افراد دیابتی ممکن است ناشی از تفاوت در پاسخ‌گویی افراد باشد. این تفاوت می‌تواند ناشی از تفاوت در مدت زمان ابتلا به دیابت، وزن گروه آزمون، شدت مقاومت به انسولین و شاخص‌های دیگر اندازه‌گیری شده در ابتدای مطالعه باشد. تاکنون چندین مطالعه در مورد تأثیر

به کاهش مقادیر سایتوکین‌های مذکور در پژوهش حاضر منجر شده است. به طورکلی، مکمل زنجیل به دلیل دارا بودن خاصیت ضدالتهابی و آنتی‌اکسیدانی (۲۸ و ۲۹) به مهار سنتز پروستاگلاندین‌ها (۳۰) و متوقف ساختن سایتوکین‌های پیش‌التهابی منجر شده است (۳۱)، همچنین گزارش شد که آثار ضدالتهابی این گیاه از طریق مسدود کردن سنتز لکوتین و پروستاگلاندین (۳۰) مهار مسیرهای سیکلاکسیژناز و لیپو‌اکسیژناز که مانع از متابولیسم اسید آراشیدونیک شده، مهار به هم چسبندگی پلاکتی (۳۲) و سرکوب تولید رادیکال‌های آزاد (۳۳) اعمال می‌شود و در نتیجه به تعديل پاسخ‌های ایمنی تشدیدکننده التهاب منجر می‌شود (۳۴) به همین طریق، بر اساس یافته‌های تحقیق حاضر، مصرف مکمل زنجیل بی‌تأثیر نبوده و به احتمال عدم مشاهده تأثیر معنی‌داری مصرف مکمل زنجیل در مقایسه با گروه‌های دارونمای مربوطه می‌تواند با عواملی از قبیل طول دوره مصرف، دوز مصرف، طول دوره تمرينی، وضعیت آمادگی بدنی آزمودنی‌های تحقیق حاضر، میزان تجربه قبلی به برنامه‌های تمرينی و حرفة‌ای نبودن آزمودنی‌ها در اجرای تمرين و وضعیت تمرينی شرکت‌کنندگان مرتبط باشد. چون گزارش شده عوامل متعددی می‌تواند اثر مصرف مکمل‌ها را بر پاسخ سایتوکین‌ها تحت تأثیر قرار دهد از جمله دوره، مقدار مصرف مکمل قبل از فعالیت، اندازه و سرعت جذب مکمل‌ها طی فعالیت، رژیم غذایی آزمودنی‌ها قبل و در طول

بر سطح سرمی α -TNF نشان داده شده است که تمرین های ورزشی موجب کاهش سطوح در گردش این سایتوکین در بیماران دیابتی، افراد سالم و بیماران قلبی - عروقی می شود، هرچند تحقیق های مختلفی کاهش α -TNF پس از تمرین ورزشی را گزارش نکردند. در این راستا در تحقیقی که به وسیله جانکرد و همکاران انجام شد، تأثیر فعالیت بدنی بر غلظت 6-IL و 10-IL در مردان مسن سالم ارزیابی شد. نتایج نشان داد افراد گروه با فعالیت سنگین در مقایسه با گروه با فعالیت سبک کاهش سطح 6-IL و افزایش سطح 10-IL را نشان دادند. در نتیجه ورزش نقش حیاتی در کنترل شاخص های التهابی بازی می کند (۴۲).

از یافته های مهم این پژوهش کاهش شاخص مقاومت به انسولین در اثر تمرین + زنجیل بود. بهبود شاخص مقاومت به انسولین بر اثر تمرین های ورزشی و مکمل زنجیل با یافته های برخی از محققان هم خوانی دارد. آتشک و همکاران پیشنهاد کردند افراد چاق می توانند با مصرف طولانی مدت زنجیل و تمرین های مقاومتی تغییرات مطلوبی در پراکسیداسیون لیپیدی و مقاومت به انسولین را تجربه نمایند (۱۹). آن ها بیان کردند ۱۰ هفته تمرین های مقاومتی پیش رو نده و مصرف زنجیل تأثیر معنی داری بر غلظت مالون دیآلئید به عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپیدی در آزمودنی های چاق دارد. زنجیل از طریق بهبود سیستم های ضد اکسایشی و

صرف زنجیل بر الگوی قند خون صورت گرفته است که نتایج مقاومتی داشته اند (۳۷-۳۹) و در اغلب آن ها تنها مکمل زنجیل به تهایی استفاده شده بود.

در ارتباط با عدم تأثیر فعالیت بدنی به تهایی بر عوامل التهابی رال و همکاران نشان دادند ۱۲ هفته تمرین قدرتی کاهشی در α -TNF و 6-IL آزمودنی های سالمند ایجاد نکرد (۴۰)، همچنین کانزارد و همکاران، نشان دادند که چهار ماه تمرین موازی استقامتی و مقاومتی سطح α -TNF و 6-IL را تغییر نمی دهد (۴۱) علاوه بر این، جورج و همکاران، در یک مطالعه تجربی اثرات سه روش مختلف تمرین موازی بر شاخص های التهابی را با هم مقایسه کردند. آن ها نشان دادند به دنبال مداخلات تمرینی قدرتی، استقامتی و موازی تفاوتی در سطوح 6-IL و α -TNF وجود ندارد (۴۲). چوی و همکاران، تأثیر سه ماه فعالیت موازی (هوازی و قدرتی) را بر ۳۰ زن چاق بررسی کردند که افزایش در 6-IL مشاهده شد (۴۳) که همسو با تحقیق حاضر بود. لیباردی و همکاران، در مدت ۱۶ هفته تمرین ترکیبی در افراد میان سال نشان دادند تفاوتی در α -TNF و 6-IL در گروه تمرین ترکیبی با گروه تمرین قدرتی بعد از تمرین وجود ندارد، آن ها نشان دادند که تمرین نمی تواند مارکرهای التهابی را کاهش دهد (۴۴). کونرادس و همکاران نیز نشان دادند که چهار ماه تمرین ترکیبی استقامتی و مقاومتی سطح α -TNF و 6-IL را تغییر نمی دهد (۴۱). در مورد تأثیر ورزش

دوز بالای این دارو را تجویز کرده‌اند (۴۸) در حالی‌که، در پژوهش حاضر از دوز پایین این دارو استفاده شده است.

محدودیت‌های پژوهش حاضر می‌توان به عدم کنترل دقیق داروهای مصرفی به بیماران و رژیم غذایی آزمودنی‌ها اشاره کرد. زیرا این متغیرها می‌توانند بر تأثیرات حاصل از مداخلات ورزشی و نتایج آزمون‌ها تأثیر بگذارد. هم‌چنین، شرایط روانشناسخی این آزمودنی‌ها در روزهای تست‌گیری از محدودیت‌های این تحقیق بود.

با توجه به این مطالعه نشان داد مصرف روزانه ۱ گرم کپسول زنجیبل به مدت ده هفته به وسیله بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس سبب کاهش شاخص‌های التهابی و کاهش میانگین قند ناشتا و مقاومت به انسولین در حین تمرین شده است و به این ترتیب مصرف این مکمل برای بیماران مناسب می‌باشد، ولی برای شناسایی سایر اثرات آن نیاز به مطالعه‌های مختلفی می‌باشد.

نتیجه‌گیری

به‌طورکلی مطالعه حاضر نشان داد ۱۰ هفتۀ تمرین هوازی توأم با مصرف مکمل زنجیبل منجر به بھبود عوامل التهابی در زنان چاق مبتلا به دیابت ملیتوس می‌گردد. از آنجا که علی‌رغم توصیه‌های لازم در مورد رژیم غذایی و تکمیل پرسشنامه یادآمد غذایی، اطمینان کامل از رعایت رژیم

حذف رادیکال‌های آزاد پلاسمما (۴۵)، دارای ویژگی‌های ضدکاسایشی نیرومندی است (۴).

در ارتباط با عدم تأثیر فعالیت بدنی به تنها یک بر مقاومت به انسولین گلبرگ و همکاران دریافتند ۸ هفته تمرینات مقاومتی باعث تغییر معنی‌داری در مقاومت به انسولین بیماران دیابتی نمی‌شود (۴۶) که همسو با تحقیق حاضر هست. یوسفی‌پور و همکاران نشان دادند انجام ۸ هفته فعالیت ورزشی هوازی یا ترکیبی با بهبود مقاومت به انسولین و گلوکز خون ناشتا، می‌تواند برای دیابتی‌های نوع ۲ سودمند باشد شاید (۴۷) دلیل اصلی تناقض در یافته‌های این محققان با یافته حاضر شدت و مدت تمرین مورداً استفاده باشد هم‌چنین شاید بتوان دلایل تناقض این یافته را در سن، وضعیت جسمانی و مقادیر متفاوت BMI آزمودنی‌ها، شدت و مدت تمرین‌ها و شاخص‌های متفاوت مورد اندازه‌گیری در تحقیق‌ها ذکر کرد. علی‌رغم این که گزارش شده مصرف زنجیبل می‌تواند باعث بهبود شاخص مقاومت به انسولین شود (۴۹) و (۴۸) در مطالعه حاضر با وجود این که سطوح انسولین و مقاومت به انسولین کاهش یافت، ولی این کاهش از نظر آماری معنی‌دار نبود. شاید یکی از دلایل احتمالی برای تناقض یافته‌های این محقق‌ها با ترتیب این پژوهش تفاوت در دوز زنجیبل مصرفی و طول دوره مصرف آن باشد. به طوری که اکثر مطالعه‌هایی که اثرات مصرف زنجیبل را بر سطوح گلوکز و انسولین پلاسمایی مورد بررسی قرار داده‌اند

غذایی به وسیله شرکت کنندگان وجود ندارد و
تعداد شرکت کنندگان در مطالعه نیز کم بود،
تحقیق بیشتر با کنترل موارد فوق، نتایج
روشن‌تری را ایجاد خواهد کرد.

تقدیر و تشکر

این تحقیق با حمایت مالی معاونت پژوهشی
دانشگاه شهرکرد انجام گرفت. لذا از حمایت آن کمال
تشکر را دارد.

REFERENCES

- 1.Javanbakht M, Baradaran HR, Mashayekhi A, Haghdoost AA, Khamseh ME, Kharazmi E, et al. Cost-of-illness analysis of type 2 diabetes mellitus in Iran. *PloS One* 2011; 6(10): e26864.
- 2.Guilder GP, Hoetzer GL, Greiner JJ, Stauffer BL, DeSouza CA. Influence of metabolic syndrome on biomarkers of oxidative stress and inflammation in obese adults. *Obesity* 2006; 14(12): 2127-31.
- 3.Mozaffari-Khosravi H, Talaei B, Jalali B-A, Najazadeh A, Mozayan MR. The effect of ginger powder supplementation on insulin resistance and glycemic indices in patients with type 2 diabetes: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Complementary Therapies in Medicine* 2014; 22(1): 9-16.
- 4.Ali BH, Blunden G, Tanira MO, Nemmar A. Some phytochemical, pharmacological and toxicological properties of ginger (*Zingiber officinale Roscoe*): a review of recent research. *Food and Chemical Toxicology* 2008; 46(2): 409-20.
- 5.Matsuda A, Wang Z, Takahashi S, Tokuda T, Miura N, Hasegawa J. Upregulation of mRNA of retinoid binding protein and fatty acid binding protein by cholesterol enriched-diet and effect of ginger on lipid metabolism. *Life Sciences* 2009; 84(25): 903-7.
- 6.Pongrojpaw D, Somprasit C, Chantha senanont A. A randomized comparison of ginger and dimenhydrinate in the treatment of nausea and vomiting in pregnancy. *Journal-Medical Association of Thailand* 2007; 90(9): 1703.
- 7.Zhang X, Tan B. Effects of an ethanolic extract of *Gynura procumbens* on serum glucose, cholesterol and triglyceride levels in normal and streptozotocin-induced diabetic rats. *Singapore Medical Journal* 2000; 41(1): 9-13.
- 8.Glund S, Krook A. Role of interleukin-6 signalling in glucose and lipid metabolism. *Acta Physiologica* 2008; 192(1): 37-48.
- 9.Ropelle ER, Flores MB, Cintra DE, Rocha GZ, Pauli JR, Morari J, et al. IL-6 and IL-10 anti-inflammatory activity links exercise to hypothalamic insulin and leptin sensitivity through IKK β and ER stress inhibition. *PLoS Biol.* 2010;8(8):e1000465.
- 10.Dabelea D, Mayer-Davis EJ, Saydah S, Imperatore G, Linder B, Divers J, et al. Prevalence of type 1 and type 2 diabetes among children and adolescents from 2001 to 2009. *Jama* 2014; 311(17): 1778-86.
- 11.Arablou T, Aryaeian N, Valizadeh M, Hosseini A, Djalali M. The effect of ginger consumption on some cardiovascular risk factors in patients with type 2 diabetes mellitus. *Razi Journal of Medical Sciences* 2014; 21(118): 1-12.
- 12.Shanmugam KR, Mallikarjuna K, Kesireddy N, Reddy KS. Neuroprotective effect of ginger on anti-oxidant enzymes in streptozotocin-induced diabetic rats. *Food and Chemical Toxicology* 2011; 49(4): 893-7.
- 13.Ahmed RS, Seth V, Banerjee B. Influence of dietary ginger (*Zingiber officinale Rosc*) on antioxidant defense system in rat: comparison with ascorbic acid. *Indian Journal of Experimental Biology* 2000; 38(6): 604-6.
- 14.Srivastava K, Mustafa T. Ginger (*Zingiber officinale*) in rheumatism and musculoskeletal disorders. *Medical Hypotheses* 1992; 39(4): 342-8.
- 15.Grzanna R, Lindmark L, Frondoza CG. Ginger-an herbal medicinal product with broad anti-inflammatory actions. *Journal of Medicinal Food* 2005; 8(2): 125-32.
- 16.Black C, O'Connor P. Short term effects of 2-grams of dietary ginger on muscle pain, inflammation and disability induced by eccentric exercise. *The Journal of Pain* 2008; 9(4): 25.
- 17.Peters EM, Smith M, Docrat A, Nadar A, Chetty K, Passmore J-AS. The Effects of a natural anti-inflammatory product on systemic markers of inflammation following downhill running: 2236: Board# 124 May 28 3: 30 PM-5: 00 PM. *Medicine & Science in Sports & Exercise* 2009; 41(5): 278.
- 18.Samaneh A, Valiollah D. Tracking changes in systemic inflammation following resistance exercise in male volleyball. *Exercise Physiology and Physical Activity* 2013; 2(1): 20.

19. Atashak S, Azarbayjani M, Piri M, Jafari A. Effects of combination of long-term ginger consumption and resistance training on lipid peroxidation and insulin resistance in obese men. *Journal of Medicinal Plants* 2012; 2(42): 179-88.
20. Padervand S, Hassani A, Kalalian Moghaddam H, Donyaei A. The effect of taking ginger supplement and progressive endurance training on cellular damage in non-athlete men. *Journal of Knowledge & Health* 2014; 9(2): 9-13.
21. Afshan S, Dabidi Roushan V. The effect of two kinds of resistance training with or without ginger supplementation on inflammatory markers. *Research in Medicine* 2016; 40(3): 118-24.
22. Diepvens K, Kovacs EM, Nijs IM, Vogels N, Westerterp-Plantenga MS. Effect of green tea on resting energy expenditure and substrate oxidation during weight loss in overweight females. *British Journal of Nutrition* 2005; 94(06): 1026-34.
23. Banitalebi E, Razavi T, Norian M, Bagheri L. The effect of combined aerobic exercise training and green tea extract on serum TNF- α and IL-6 levels in obese women with type 2 diabetes. *Daneshvarmed* 2016; 23(123): 11-20.
24. Mahluji S, Attari VE, Mobasseri M, Payahoo L, Ostadrahimi A, Golzari SE. Effects of ginger (*Zingiber officinale*) on plasma glucose level, HbA1c and insulin sensitivity in type 2 diabetic patients. *International Journal of Food Sciences and Nutrition* 2013; 64(6): 682-6.
25. Bloomer RJ, Larson DE, Fisher-Wellman KH, Galpin AJ, Schilling BK. Effect of eicosapentaenoic and docosahexaenoic acid on resting and exercise-induced inflammatory and oxidative stress biomarkers: a randomized, placebo controlled, cross-over study. *Lipids in Health and Disease* 2009; 8(1): 1.
26. Atashak S, Peeri M, Jafari A. Effects of 10 week resistance training and ginger consumption on C-reactive protein and some cardiovascular risk factors in obese men. *Physiology and Pharmacology* 2010; 14(3): 318-28.
27. Tripathi S, Maier KG, Bruch D, Kittur DS. Effect of 6-gingerol on pro-inflammatory cytokine production and costimulatory molecule expression in murine peritoneal macrophages. *Journal of Surgical Research* 2007; 138(2): 209-13.
28. Totsch SK, Waite ME, Sorge RE. Chapter Fifteen-Dietary Influence on Pain via the Immune System. *Progress in molecular biology and translational science* 2015; 131: 435-69.
29. Wang S, Zhang C, Yang G, Yang Y. Biological properties of 6-gingerol: a brief review. *Natural Product Communications* 2014; 9(7): 1027-30.
30. Ueda H, Ippoushi K, Takeuchi A. Repeated oral administration of a squeezed ginger (*Zingiber officinale*) extract augmented the serum corticosterone level and had anti-inflammatory properties. *Bioscience Biotechnology and Biochemistry* 2010; 74(11): 2248-52.
31. Habib SHM, Makpol S, Hamid NAA, Das S, Ngah WZW, Yusof YAM. Ginger extract (*Zingiber officinale*) has anti-cancer and anti-inflammatory effects on ethionine-induced hepatoma rats. *Clinics* 2008; 63(6): 807-13.
32. Van Breemen RB, Tao Y, Li W. Cyclooxygenase-2 inhibitors in ginger (*Zingiber officinale*). *Fitoterapia* 2011; 82(1): 38-43.
33. Dugasani S, Pichika MR, Nadarajah VD, Balijepalli MK, Tandra S, Korlakunta JN. Comparative antioxidant and anti-inflammatory effects of [6]-gingerol,[8]-gingerol,[10]-gingerol and [6]-shogaol. *Journal of Ethnopharmacology* 2010; 127(2): 515-20.
34. Tripathi S, Bruch D, Kittur DS. Ginger extract inhibits LPS induced macrophage activation and function. *BMC Complementary and Alternative Medicine*. 2008; 8(1): 1.
35. Willoughby D, McFarlin B, Bois C. Interleukin-6 expression after repeated bouts of eccentric exercise. *International Journal of Sports Medicine* 2003; 24(01): 15-21.
36. Vassilakopoulos T, Karatza M-H, Katsaounou P, Kollintza A, Zakynthinos S, Roussos C. Antioxidants attenuate the plasma cytokine response to exercise in humans. *Journal of Applied Physiology* 2003; 94(3): 1025-32.

37. Arablou T, Aryaeian N, Valizadeh M, Hosseini Tehrani S, Jalali BA. The effect of ginger consumption on cardiovascular disease risk factors in patients with type 2 diabetes. *RJMS* 2014; 21(118): 1-12.
38. Verma S, Singh M, Jain P, Bordia A. Protective effect of ginger, *Zingiber officinale* rose on experimental atherosclerosis in rabbits. *Indian Journal of Experimental Biology* 2004; 42(7): 736-8.
39. Atashak S, Azarbayjani M, Piri M, Jafari A. Effects of combination of long-term ginger consumption and resistance training on lipid peroxidation and insulin resistance in obese men. *Journal of Medicinal Plants* 2015; 2(42): 179-88.
40. Rall LC, Roubenoff R, Cannon JG, Abad LW, Dinarello CA, Meydani SN. Effects of progressive resistance training on immune response in aging and chronic inflammation. *Medicine and Science in Sports and Exercise* 1996; 28(11): 1356-65.
41. Conraads V, Beckers P, Bosmans J, De Clerck L, Stevens W, Vrints C, et al. Combined endurance/resistance training reduces plasma TNF- α receptor levels in patients with chronic heart failure and coronary artery disease. *European Heart Journal* 2002; 23(23): 1854-60.
42. Jorge MLMP, de Oliveira VN, Resende NM, Paraiso LF, Calixto A, Diniz ALD, et al. The effects of aerobic, resistance, and combined exercise on metabolic control, inflammatory markers, adipocytokines, and muscle insulin signaling in patients with type 2 diabetes mellitus. *Metabolism* 2011; 60(9): 1244-52.
43. Choi K, Kim T, Yoo H, Lee K, Cho G, Hwang T, et al. Effect of exercise training on A-FABP, lipocalin-2 and RBP4 levels in obese women. *Clinical Endocrinology* 2009; 70(4): 569-74.
44. Libardi CA, Souza GV, GÁspari AF, Santos CFD, Leite ST, Dias R, et al. Effects of concurrent training on interleukin-6, tumour necrosis factor-alpha and C-reactive protein in middle-aged men. *Journal of Sports Sciences* 2011; 29(14): 1573-81.
45. Afshari AT, Shirpoor A, Farshid A, Saadatian R, Rasmi Y, Saboory E, et al. The effect of ginger on diabetic nephropathy, plasma antioxidant capacity and lipid peroxidation in rats. *Food Chemistry* 2007; 101(1): 148-53.
46. Colberg SR, Parson HK, Nunnold T, Herriott MT, Vinik AI. Effect of an 8-week resistance training program on cutaneous perfusion in type 2 diabetes. *Microvascular Research* 2006; 71(2): 121-7.
47. Yousefipoor P, Tadibi V, Behpoor N, Parnow A, Delbari M, Rashidi S. The Effect of 8-week Aerobic and Concurrent (aerobic- resistance) Exercise Training on Serum IL-6 Levels and Insulin Resistance in Type 2 Diabetic Patients. *J Shahid Sadoughi Univ Med Sci* 2013; 21(5): 619-31.
48. Hafez DA. Effect of extracts of ginger roots and cinnamon bark on fertility of male diabetic rats. *J Am Sci* 2010; 6: 940-7.
49. Akhani S, Vishwakarma S, Goyal R. Antidiabetic activity of *Zingiber officinale* roscoe in streptozotocin-induced non-insulin dependent diabetic rats. *Indian Journal of Pharmaceutical Sciences* 2005; 67(5): 553-7.

The Effect Of A Period Rhythmic Aerobic Exercise With Ginger Consumption On Serum Levels Of TNF-A, IL-6 And Insulin Resistance In Obese Middle-Aged Women With Diabetes Mellitus

Banitalebi E^{1*}, Afsardir ZS², Ghafari M¹, Asadi M³

¹Department of Science in Exercise Physiology, University of Shahrekord, Shahrekord ,Iran, ² Department of Science in Exercise Physiology, Islamic Azad University, Yasouj branch, Yasouj, Iran, ³Department of Science in Exercise Physiology,Isfahan University, Isfahan ,Iran

Received: 14 Jan 2017 Accepted: 25 Apr 2017

ABSTRACT

Background & aim: Diabetes is a metabolic disorder associated with neuropathy, renal diseases, peripheral vascular disease, atherosclerosis, high blood pressure and inflammation. The use of supplements, herbal extracts, and exercise training for the treatment of diseases and metabolic disorders is common among people. The aim of this study was to investigate the effect effect of a period rhythmic aerobic exercise with ginger consumption on serum levels of TNF- α , IL-6 and Insulin resistance in obese middle-aged women with diabetes mellitus

Methods: In the present study, 46 obese diabetic women (BMI > 30, blood fasting sugar more than 150-250 mg/dL, 45-60 years old) were selected and randomly assigned into four groups including: ginger (n=12), aerobic exercise training + ginger (n=12), aerobic exercise training (n=12) and control (n=10). Participants in supplementary groups received four 250 mg capsules ginger extract 1000 mg daily for 10 weeks. Aerobic training program included 10 weeks of training, 3 sessions per week and each session was 60 minutes at 55% maximum heart rate during the first week and gradually increased with the progress of the training program to 75 percent of maximum heart rate. Each session consists of warm up (10 minutes), the main part of the training involves performing aerobic exercises in a standing position (40 minutes) and recovery in sitting (10 minutes).

Results: No significant difference between four groups at level of TNF- α and IL6 was seen, but a significant degrease was observed between pre-test and post-test in (Training + ginger) group at levels of TNF- α ($p=0.028$), IL-6 ($p=0.012$), insulin resistance ($p=0.009$), insulin ($p=0.007$) and fasting serum glucose ($p=0.000$),

Conclusion: According to obtained results, it appeared that aerobic training plus ginger extract consumption had better effect on serum inflammatory factors in obsess women with diabetes type 2.

Keywords: Rhythmic aerobic training, Diabetes mellitus, TNF- α , IL-6, Ginger

*Corresponding author: Banitalebi E, Department of Science in Exercise Physiology, University of Shahrekord, Shahrekord ,Iran
Email: banitalebi.e@gmail.com

Please cite this article as follows:

Banitalebi E, Afsardir ZS, Ghafari M, Asadi M. The Effect Of A Period Rhythmic Aerobic Exercise With Ginger Consumption On Serum Levels Of TNF-A, IL-6 And Insulin Resistance In Obese Middle-Aged Women With Diabetes Mellitus. Armaghane-danesh 2017; 22 (1): 32-47.